

Payızlıq yumşaq buğda sortu Ləyaqətli-80

Sort 2011-ci ildə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasına təqdim olunmuşdur.

Mənşəyi: Sort Beynəlxalq Seleksiya Mərkəzindən alınmış payızlıq buğdanın yarım-quraq bölgələr üçün 7-ci müşahidə pitomnikində (7th WON-SA №473) olan buğda genotiplərinin-dən fərdi seçmə yolu ilə alınmışdır.

Ümumi xarakteristikası: Sort ortaboyludur (98-108 sm), gövdəsi möhkəm, yatmaya davamlıdır, məhsuldar kollanması 3,2-3,6-dır. Vegetasiya müddəti dağlıq və dağətəyi bölgələrdə 242-246 gün olub Bezostaya 1 sortundan 6-8 gün tez yetişir. Sünbülü iyyari, orta ölçüdə, ağ rəngdə, qılçıqlıdır. Qılçıqları zəif və şaxələnməmişdir. Sortun dənə orta irilikdə və şırımın xarakterini dayaz, rəngi qırmızı olub, yumurtavari və qayəsi tüküldür. Sünböldə sünbüllüklər orta sıxlıqda yerləşmiş, sünböldə dənələrin sayı 52-54 ədəddir.

Növmüxtəlifliyi: Yumşaq buğdanın eritrospermum növmüxtəlifliyinə aiddir.

Məhsuldarlığı: Sortun Qobustan Bölgə Təcrübə Stansiyasında orta məhsuldarlığı dəmyədə 5,42t/ha olub rayonlaşmış Bezostaya 1 sortundan 1,0-1,5 tondan artıq dənə məhsulu vermişdir. Potensial məhsuldarlığı dağlıq və dağətəyi quraq dəmyə şəraitində 5,5-6,0 t/ha-dır.

Dənə keyfiyyəti: 1000 dənənin kütləsi 39-41 qramdır. Dəndə zülalın miqdarı 14,6-15,1%, kleykovina 30,6-34,4%-dir.

Xəstəliklərə və iqlim şəraitinə davamlılığı: Sarı və qonur pas, unlu şəh, sürmə xəstəliklərinə, qışa və quraqlığa qarşı davamlıdır.

Becərilmə bölgələri və sələfləri: Əsasən respublikanın nəmliklə təmin olunmayan dağlıq və dağətəyi bölgələrində becərilməsi təklif olunur. Dəmyə bölgələrində əsasən noxud sələfindən və qara herikdən sonra ekilməsi daha münasibdir.

Səpin müddəti: Dağlıq və dağətəyi dəmyə şəraitində optimal səpin müddəti sentyabr ayının 20-dən oktyabrın 10-dəkdir.

Səpin norması: Dağlıq və dağətəyi dəmyə şəraitində hektara 4,0-4,5 milyon cücərən toxum səpilməsi tövsiyə olunur.

Payızlıq yumşaq buğda sortu “Baqrat”

Mənşəyi: Baqrat yumşaq buğda sortu Rusiya Federasiyasının P.P. Lukyanenko adına Krasnodar Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatı institutunda yaradılmışdır və patentlə mühafizə olunur. 2020-ci ildən Azərbaycanda seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət Reyesterində qeydiyyatdadır.

Ümumi xarakteristikası: Sort orta boylu olub (81-102sm) olub yatmaya və dənə tökülməsinə qarşı davamlıdır. Vegetasiya müddəti 219-278 gün olub ortatezyetışəndir. Kollanması yaxşıdır. Sünbülü qılçıqsız, orta uzunluqda və ağ rəngdədir. Dənələri orta irilikdə və yumurtavari formadadır.

Növmüxtəlifliyi: Yumşaq buğdanın lütessens növmüxtəlifliyinə aiddir.

Məhsuldarlığı: Sortun potensial məhsuldarlığı 100s/ha-dır. Dənənin keyfiyyəti: Becərilmə şəraitindən asılı olaraq 1000 dənənin çəkisi 38-42qr, dəndə zülalın miqdarı 13-14%, kleykovinanın miqdarı 28-37%-dir. Dənənin rəngi qırmızıdır.

Xəstəliklərə və iqlim şəraitinə davamlılığı: Sarı və qəhvəyi pas, sürmə xəstəliklərinə, unlu şəh, septerioza və sünbul fusariumuna qarşı orta davamlıdır. Şaxtaya və quraqlığa isə orta davamlıdır. Viruslara qarşı orta davamlıdır.

Becərilmə bölgələri və sələfləri: Respublikamızın suvarılan və dəmyə bölgələrində becərilməsi təklif olunur. Sələf kimi dənəli-paxlalı bitkilər, çoxillik paxlalı ot bitkiləri, herik, tərəvəz bitkiləri, pambıq və digər cərgəarası becərilən bitkilərdən sonra ekilməsi məqsədəuyğundur.

Səpin müddəti və norması: Dağlıq və dağətəyi dəmyə şəraitində optimal səpin müddəti sentyabr ayının 20-dən oktyabrın 10-dək, suvarma şəraitində isə oktyabrın ikinci və noyabrın birinci on günlükləri aralığı hesab olunur. Suvarma şəraitində hektara 4,0-4,5 milyon, dəmyə şəraitində 3,5-4,0 milyon cücərən toxum səpilməsi tövsiyə olunur.



Toxumçuluq
—Tingçilik—

+994 51 206 19 85
+012 510 88 48 (105)

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu
Ələsgər Qayıbov küçəsi 12/1222

Payızlıq yumşaq buğda sortu “Aleksiç”

Mənşəyi: “Aleksiç” yumşaq buğda sortu P.P. Lukyanenko adına Krasnodar Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda yaradılmışdır və patentlə mühafizə olunur. 2020-ci ildən Azərbaycanda Seleksiya Nailiyyətlərinin Dövlət Reyesterində qeydiyyatdadır.

Ümumi xarakteristikası: Sort orta boylu olub (77-96 sm), yatmaya qarşı davamlıdır. Vegetasiya müddəti 228-279 gün olub orta yetişəndir. Yüksək kollanma qabiliyyətinə malikdir. Cücərtiləri və boruya qalxma fazasında yarpaqları tünd yaşıl rəngdə olur. Sünbül piramida formasında olub orta uzunluqda və ağ rəngdədir. Dənləri orta irilikdə və yumurtavari formadadır.

Növmüxtəlifliyi: Yumşaq buğdanın lütessens növmüxtəlifliyinə aiddir

Məhsuldarlığı: Sortun potensial məhsuldarlığı 130s/ha-dır. Dənin keyfiyyəti: Becərmə şəraitindən asılı olaraq 1000 dənin çəkisi 38-41 qram, dəndə zülalın miqdarı 13-14%, kleykovinin miqdar 25-27%-dir. Yüksək texnoloji və çörəkbişirmə xüsusiyyətlərinə malikdir.

Xəstəliklərə və iqlim şəraitinə davamlılığı: Pas xəstəliklərinə qarşı yüksək davamlı, unlu şəh və sürmə xəstəliklərinə qarşı orta davamlı, septerioza və sünbul fuzariumuna qarşı, orta həssasdır. Virus xəstəliklərinə isə orta davamlıdır. Şaxtaya davamlılığı yüksək, quraqlığa isə orta davamlıdır.

Becərilmə bölgələri və sələfləri: Respublikamızın suvarılan və dəmyə bölgələrində becərilməsi təklif olunur. Sələf kimi dənli-paxlalı bitkilər, çoxillik paxlalı ot bitkiləri, herik, tərəvəz bitkiləri, pambıq və digər cərgəarası becərilən bitkilərdən sonra əkilməsi məqsədəuyğundur.

Səpin müddəti və norması: Dağlıq və dağətəyi dəmyə şəraitində optimal səpin müddəti sentyabr ayının 20-dən oktyabrın 10-dək, suvarma şəraitində isə oktyabrın ikinci və noyabrın birinci on günlükləri aralığı hesab olunur. Suvarma şəraitində hektara 4,0-4,5 milyon, dəmyə şəraitində 3,5-4,0 milyon cücərən toxum səpilməsi tövsiyə olunur.

Payızlıq yumşaq buğda sortu “Qrom”

Mənşəyi: Qrom yumşaq buğda sortu P.P. Lukyanenko adına Krasnodar Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatı institutunda yaradılmışdır və patentlə mühafizə olunur. 2018-ci ildən Azərbaycanda seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət Reyesterində qeydiyyatdadır.

Ümumi xarakteristikası: Sort orta boylu olub (85-90 sm) olub, gövdəsi möhkəm, yatmaya davamlıdır. Vegetasiya müddəti 223-278 gün olub ortatezyetışəndir. Kollanması yaxşıdır, dən tökülməsinə qarşı davamlıdır. Sünbüldə dənlərin sayı 40-50 ədəddir. Dənləri orta irilikdə və yumurtavari formadadır.

Növmüxtəlifliyi: Yumşaq buğdanın lütessens növmüxtəlifliyinə aiddir

Məhsuldarlığı: Sortun potensial məhsuldarlığı 100-110 s/ha-dır

Dənin keyfiyyəti: Becərmə şəraitindən asılı olaraq 1000 dənin çəkisi 33-48 qram, dəndə zülalın miqdarı 12-14%, kleykovinin miqdar 25-28%-dir. Yüksək texnoloji və çörəkbişirmə xüsusiyyətinə malikdir.

Xəstəliklərə və iqlim şəraitinə davamlılığı: Pas xəstəliklərinə qarşı yüksək davamlı, unlu şəh və sürmə xəstəliklərinə qarşı isə orta davamlı, septerioza və sünbul fuzariumuna qarşı orta həssasdır. Virus xəstəliklərinə orta davamlıdır. Şaxtaya davamlılığı yüksək, quraqlığa isə orta davamlıdır.

Becərilmə bölgələri və sələfləri: Respublikamızın suvarılan və dəmyə bölgələrində becərilməsi təklif olunur. Sələf kimi dənli-paxlalı bitkilər, çoxillik paxlalı ot bitkiləri, herik, tərəvəz bitkiləri, pambıq və digər cərgəarası becərilən bitkilərdən sonra əkilməsi məqsədəuyğundur.

Səpin müddəti və norması: Dağlıq və dağətəyi dəmyə şəraitində optimal səpin müddəti sentyabr ayının 20-dən oktyabrın 10-dək, suvarma şəraitində isə oktyabrın ikinci və noyabrın birinci on günlükləri aralığı hesab olunur. Suvarma şəraitində hektara 4,0-4,5 milyon, dəmyə şəraitində 3,5-4,0 milyon cücərən toxum səpilməsi tövsiyə olunur.

Payızlıq yumşaq buğda sortu “Bezostaya -100”

Mənşəyi: “Bezostaya -100” yumşaq buğda sortu Rusiya Federasiyasının P.P. Lukyanenko adına Krasnodar Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatı institutunda yaradılmışdır və patentlə mühafizə olunur. 2020-ci ildən Azərbaycanda seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət Reyesterində qeydiyyatdadır.

Ümumi xarakteristikası: Sort orta boylu olub (81-104sm) olub gövdəsi möhkəm, yatmaya və dən tökülməsinə qarşı davamlıdır. Vegetasiya müddəti 221-296 gün olub ortatezyetışəndir. Kollanması yaxşıdır. Sünbulu orta uzunluqda, ağ rəngdə və qılçıqsızdır. Dənləri orta irilikdə və yumurtavari formadadır.

Növmüxtəlifliyi: Yumşaq buğdanın lütessens növmüxtəlifliyinə aiddir

Məhsuldarlığı: Sortun potensial məhsuldarlığı 100s/ha-dır

Dənin keyfiyyəti: Becərilmə şəraitindən asılı olaraq 1000 dənin çəkisi 38-42qr, dəndə zülalın miqdarı 13-14%, kleykovinin miqdar 28-37%-dir. Dənin rəngi qırmızıdır. Yüksək texnoloji və çörəkbişirmə xüsusiyyətinə malikdir

Xəstəliklərə və iqlim şəraitinə davamlılığı: Pas xəstəliklərinə qarşı yüksək davamlı, unlu şəh və sürmə xəstəliklərinə qarşı orta davamlı, septerioza və sünbul fuzariumuna qarşı, orta həssasdır. Virus xəstəliklərinə isə orta davamlıdır. Şaxtaya davamlılığı yüksək, quraqlığa isə orta davamlıdır.

Becərilmə bölgələri və sələfləri: Respublikamızın suvarılan və dəmyə bölgələrində becərilməsi təklif olunur. Sələf kimi dənli-paxlalı bitkilər, çoxillik paxlalı ot bitkiləri, herik, tərəvəz bitkiləri, pambıq və digər cərgəarası becərilən bitkilərdən sonra əkilməsi məqsədəuyğundur.

Səpin müddəti və norması: Dağlıq və dağətəyi dəmyə şəraitində optimal səpin müddəti sentyabr ayının 20-dən oktyabrın 10-dək, suvarma şəraitində isə oktyabrın ikinci və noyabrın birinci on günlükləri aralığı hesab olunur. Suvarma şəraitində hektara 4,0-4,5 milyon, dəmyə şəraitində 3,5-4,0 milyon cücərən toxum səpilməsi tövsiyə olunur.